

Wichtige Hinweise zur Anwendung von Minoxidil 5% (topisch)

- **Wann sollten Sie beginnen:** Beginnen Sie 3-4 Wochen nach der Operation mit der Anwendung der Minoxidil-5%-Lösung.
- **Dosierung und Anwendung:** Tragen Sie die Lösung einmal täglich auf. Die Anwendung morgens gilt als optimal. Da die Lösung jedoch im Haar sichtbar sein kann und es morgens oft hektisch ist, empfehlen wir die Anwendung vor dem Schlafengehen. Tragen Sie so viel Lösung auf, dass der Bereich mit Haarausfall vollständig bedeckt ist, damit sie über die Kopfhaut aufgenommen werden kann.
- **Anfänglicher Haarausfall:** Nach Beginn der Anwendung von Minoxidil 5% kann es vorübergehend zu verstärktem Haarausfall kommen. Das ist normal; die Haare wachsen anschließend von selbst wieder nach.
- **Mögliche Nebenwirkungen:**
 - Zu Beginn der Anwendung können Juckreiz, Hautausschlag oder eine Follikulitis (Haarbalgentzündung) auftreten.
 - Reduzieren Sie in diesem Fall die Menge oder pausieren Sie die Anwendung für einige Tage, bis sich die Symptome bessern.
 - Wenn die Reizung anhält, beenden Sie die Anwendung und besprechen Sie dies bei Ihrem nächsten Termin mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt.



This Page



WhatsApp

WhatsApp: [821048468074](https://wa.me/821048468074)

E-Mail: consult@maxwellhairclinic.com

Adresse: [11F, 120 Sanggyeong Building, Teheran-ro, Gangnam gu, Seoul](#)