

Consignes préopératoires

- Si vous suivez actuellement un traitement médicamenteux, demandez à votre médecin des consignes particulières.
- Arrêtez de prendre tout médicament, sauf s'il est absolument indispensable.
- Les patients souffrant d'hypertension artérielle ou de diabète doivent poursuivre leur traitement prescrit. En revanche, si vous prenez de l'aspirine ou des anticoagulants (fluidifiants sanguins), vous devez les arrêter 7 jours avant l'intervention, ou suivre les consignes de votre médecin.
- Comme des follicules pileux sains permettent d'obtenir de meilleurs résultats en restauration capillaire, il est conseillé de recourir à une mésothérapie ou à des traitements aux facteurs de croissance issus de cellules souches afin d'améliorer l'état du cuir chevelu avant l'intervention.
- Avant l'intervention, si vous utilisez des traitements topiques tels qu'une solution de minoxidil à 5 % ou un shampooing antichute, demandez conseil à votre médecin.
- Informez votre médecin chez Maxwell si vous avez déjà présenté une réaction allergique à l'anesthésie ou aux antibiotiques.
- Si vous avez des cheveux gris ou blancs, il est recommandé de les teindre en noir 2 à 3 jours avant l'intervention, car ils sont plus difficiles à distinguer pendant la procédure.
- Arrêtez de fumer et de consommer de l'alcool au moins 7 jours avant l'intervention.
- Ne portez ni maquillage, ni bijoux, ni lentilles de contact, et retirez votre vernis à ongles ainsi que vos faux ongles en acrylique avant votre arrivée pour l'intervention.



This Page



WhatsApp

WhatsApp : [821048468074](https://wa.me/821048468074)

Adresse e-mail : consult@maxwellhairclinic.com

Adresse : [11F, 120 Sanggyeong Building, Teheran-ro, Gangnam gu, Seoul](#)