

# Vorsichtsmaßnahmen bei der oralen Einnahme (Finasterid 1 mg oder Dutasterid 0,5 mg)

- **Dosierung:** Nehmen Sie das Medikament einmal täglich etwa zur gleichen Zeit ein. Es kann vor oder nach den Mahlzeiten eingenommen werden, da es den Magen nicht reizt.
- **Sicherheit:** Die langfristige Einnahme ist im Allgemeinen sicher, sofern keine Lebererkrankung vorliegt. Es kann zusammen mit den meisten anderen Arzneimitteln eingenommen werden, einschließlich Mitteln gegen Bluthochdruck, Diabetes, Erkältungen oder Schmerzen. Alkohol beeinflusst die Wirkung des Arzneimittels nicht, aber starker Alkoholkonsum kann zu Haarausfall beitragen.
- **Mögliche Nebenwirkungen:**
  - Ein kleiner Prozentsatz der Patienten kann eine verminderte Libido oder eine Müdigkeit verspüren, die einer Depression ähnelt.
  - Das Medikament kann das Samenvolumen verringern, jedoch nicht das Ejakulatvolumen, und es beeinflusst weder die Fruchtbarkeit noch die allgemeine Gesundheit.
  - Selten können Brustspannen, Schwellungen oder Hautausschlag auftreten. Diese Nebenwirkungen verschwinden in der Regel, sobald das Medikament abgesetzt wird.
- **Kontrolluntersuchungen:** Ihr Arzt wird nach einem Monat Anwendung auf Nebenwirkungen (z. B. verminderte Libido) achten und die Verschreibung bei Bedarf anpassen. Danach werden Kontrolltermine alle 3–6 Monate für fortlaufende Verschreibungen empfohlen.
- **Behandlungsdauer:** Die Einnahme des Medikaments ist nicht zwingend lebenslang erforderlich, in der Regel sollte es jedoch mindestens ein bis zwei Jahre eingenommen werden, um spürbare Ergebnisse zu erzielen.



This Page



WhatsApp

WhatsApp: [821048468074](https://wa.me/821048468074)

E-Mail: [consult@maxwellhairclinic.com](mailto:consult@maxwellhairclinic.com)

Adresse: [11F, 120 Sanggyeong Building, Teheran-ro, Gangnam gu, Seoul](#)