

احتياطات استخدام المينوكسيديل الموضعي بتركيز 5%

- متى يجب البدء: ابدأ باستخدام محلول المينوكسيديل 5% بعد 3 إلى 4 أسابيع من الجراحة.
- الجرعة وطريقة الاستخدام: يُستخدم المحلول مرة واحدة يوميًا. ورغم أن استخدامه صباحًا يُعد الأفضل، فإنه قد يظهر على الشعر، ولأن الصباح يكون غالبًا وقتًا مزدحمًا، يُنصح باستخدامه قبل النوم. ضع كمية كافية من المحلول لتغطية منطقة تساقط الشعر بالكامل حتى تمتصه فروة الرأس.
- التساقط المبدئي: قد يحدث تساقط مؤقت للشعر بعد البدء باستخدام المينوكسيديل 5%. وهذا أمر طبيعي، وسينمو الشعر مجددًا تلقائيًا.
- الآثار الجانبية المحتملة:
 - قد تحدث حكة أو طفح جلدي أو التهاب بصيالات الشعر عند بدء استخدام المحلول.
 - إذا حدث ذلك، فقلل الكمية أو توقف عن استخدامه لبضعة أيام حتى تتحسن الأعراض.
 - إذا استمر التهيج، فتوقف عن استخدامه واستشر طبيبك في زيارتك القادمة.

واتساب: [821048468074](https://www.whatsapp.com/channel/00299821048468074)

البريد الإلكتروني: consult@maxwellhairclinic.com

العنوان: [الطابق الحادي عشر، مبنى سانغيونغ، 120 تيهيران-رو، غانغنام-غو، سيول](#)



واتساب



هذه الصفحة