

احتياطات استخدام الدواء الفموي (فيناسترايد 1 ملغ أو دوتاسترايد 0.5 ملغ)

- الجرعة: يُؤخذ الدواء مرة واحدة يومياً في الوقت نفسه تقريباً كل يوم. ويمكن تناوله قبل الوجبات أو بعدها، لأنه لا يسبب تهيجاً للمعدة.
- سلامة الاستخدام: يُعدّ الاستخدام طويل الأمد آمناً عموماً ما لم يكن لدى المريض مرضٌ كبدي. كما يمكن تناوله مع معظم الأدوية الأخرى، بما في ذلك أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري ونزلات البرد ومسكنات الألم. ولا يتعارض الكحول مع الدواء، لكن الإفراط في شربه قد يساهم في تساقط الشعر.
- الآثار الجانبية المحتملة:
 - قد يعاني بعض المرضى، بنسبة قليلة، من انخفاض الرغبة الجنسية أو شعور بالإرهاق يشبه ما قد يصاحب الاكتئاب.
 - قد يقلل الدواء كمية السائل المنوي، لكنه لا يؤثر في حجم السائل عند القذف، كما لا يؤثر في الخصوبة أو الصحة العامة.
 - في حالات نادرة، قد يحدث ألم أو تورم في الثدي أو طفح جلدي. وعادةً ما تزول هذه الآثار الجانبية بمجرد إيقاف الدواء.
- المتابعة الطبية: سيقوم الطبيب بمتابعة أي آثار جانبية، مثل انخفاض الرغبة الجنسية، بعد شهر من بدء الاستخدام، وسيُعدّل الوصفة عند الحاجة. وبعد ذلك، يُوصى بزيارات متابعة كل 3 إلى 6 أشهر للاستمرار في الحصول على الوصفة العلاجية.
- مدة العلاج: ليس من الضروري تناول هذا الدواء مدى الحياة، لكن عادةً ما يلزم الاستمرار عليه لمدة سنة إلى سنتين على الأقل لملاحظة فوائد واضحة.

واتساب: [821048468074](https://www.whatsapp.com/channel/00299821048468074)

البريد الإلكتروني: consult@maxwellhairclinic.com

العنوان: [الطابق الحادي عشر، مبنى سانغيونغ، 120 تيهيران-رو، غانغنام-غو،](#)

[سيول](#)



واتساب



هذه الصفحة