

Précautions concernant le traitement oral (finastéride 1 mg ou dutastéride 0,5 mg)

- **Posologie :** Prenez ce médicament une fois par jour, à peu près à la même heure. Vous pouvez le prendre avant ou après les repas, car il n'irrite pas l'estomac.
- **Sécurité d'emploi :** L'utilisation à long terme est généralement sans danger, sauf en cas de maladie du foie. Ce médicament peut être pris avec la plupart des autres médicaments, y compris ceux contre l'hypertension, le diabète, le rhume ou la douleur. L'alcool n'interagit pas avec ce médicament, mais une consommation excessive peut contribuer à la chute des cheveux.
- **Effets indésirables possibles :**
 - Une faible proportion de patients peut ressentir une baisse de la libido ou une fatigue pouvant s'apparenter à un état dépressif.
 - Le médicament peut réduire le volume du sperme, sans altérer l'éjaculation, et n'affecte ni la fertilité ni l'état de santé général.
 - Rarement, une sensibilité mammaire, un gonflement ou une éruption cutanée peuvent survenir. Ces effets indésirables disparaissent généralement après l'arrêt du médicament.
- **Suivi :** Votre médecin vérifiera, après 1 mois de traitement, la survenue d'éventuels effets indésirables, tels qu'une baisse de la libido, et adaptera la prescription si nécessaire. Ensuite, des consultations de suivi tous les 3 à 6 mois sont recommandées pour renouveler le traitement.
- **Durée du traitement :** Le traitement n'est pas nécessairement à vie, mais il doit généralement être poursuivi pendant au moins 1 à 2 ans pour obtenir des résultats visibles.



Sur cette page



WhatsApp

WhatsApp : [821048468074](https://wa.me/821048468074)

Adresse e-mail : consult@maxwellhairclinic.com

Adresse : [11e étage, immeuble Sanggyeong, 120 Teheran-ro, Gangnam-gu, Séoul](#)